

## ■ 予防接種カレンダー

は望ましい時期の例、①②などの数字はワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。実際に接種する予防接種とスケジュールについては、市区町村の予防接種担当窓口、かかりつけ小児科医に相談しましょう。予防接種は法令等で変更になることがあります。

(令和2年10月1日 情報更新)

| 種類             | ワクチン                                                | 受ける回数                                                             | 標準的な時期                    | 乳児期          |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        | 学童期    |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|-----------------------|--|
|                |                                                     |                                                                   |                           | 2<br>か<br>月  | 3<br>か<br>月                                                  | 4<br>か<br>月 | 5<br>か<br>月 | 6<br>か<br>月 | 7<br>か<br>月 | 8<br>か<br>月 | 9<br>か<br>月 | 12<br>か<br>月 | 15<br>か<br>月 | 18<br>か<br>月 | 2<br>歳 | 3<br>歳 | 4<br>歳 | 5<br>歳 | 6<br>歳 | 7<br>歳 | 8<br>歳 | 9<br>歳 | 10歳～ |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
| 定期<br>接<br>種   | インフルエンザ菌b型(Hib)                                     | 計4回／初回は27～56日間隔で3回、<br>その後7～13か月おいて追加1回                           | 初回は生後2～7か月未満              | ①            | ②                                                            | ③           |             |             |             |             |             | ④            |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
|                | 小児用肺炎球菌                                             | 計4回／初回は27日以上の間隔で3回、<br>その後60日以上おいて1歳以降に追加1回                       | 初回は生後2～7か月未満              | ①            | ②                                                            | ③           |             |             |             |             |             | ④            |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
|                | B型肝炎(HBV)                                           | 計3回／27日以上の間隔をあけて2回、<br>その後1回目から139日以上あけて1回接種                      | 生後2～9か月未満                 | ①            | ②                                                            |             |             | ③           |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
|                | ロタウイルス                                              | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(1価／2回接種)・5価経口<br>弱毒生ロタウイルスワクチン(5価／3回接種)のいずれかを接種 | 1価<br>5価                  | ① ②<br>① ② ③ | 生後6週から接種可能、1回目は8週～15週未満を推奨<br>1価は生後24週0日まで、5価は生後32週0日までに完了する |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
|                | 四種混合(DPT-IPV)<br>ジフテリア:D<br>百日せき:P<br>破傷風:T ポリオ:IPV | 計4回／1回～3回の間はそれぞれ20～56<br>日(3～8週間)あける<br>3回目の後は1年～1年6か月後に1回接種      | 生後3か月～1歳に<br>最初の3回を       |              | ①                                                            | ②           | ③           |             |             |             |             |              | ④            |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
|                | BCG                                                 | 1回                                                                | 生後5～8か月未満                 |              |                                                              |             | ①           |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
|                | 麻しん・風しん(MR)                                         | 計2回／1回目は1歳以上2歳未満、2回目は<br>5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間                      | 1歳になったらできるだ<br>け早く受けましょう！ |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              | ①            |              |        |        |        | ②      |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
|                | 水痘(水ぼうそう)                                           | 計2回/間隔は3か月以上(標準は6～12か月)あける                                        | 初回は1歳～1歳3か月未満             |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              | ①            | ②            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
|                | 日本脳炎                                                | 1期:6日～28日間隔で2回                                                    | 3歳                        |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
|                |                                                     | 1期追加:初回終了後、おおむね1年後に1回<br>2期:1回                                    | 4歳<br>9歳                  |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           |                       |  |
| 二種混合(DT)       | 1回                                                  | 11歳                                                               |                           |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  | ①   | 2期:11～12歳 |                       |  |
| ヒトパルボウイルス(HPV) | 計3回＊女子のみ                                            | 13歳となる日の属する年度の初日～末日まで                                             |                           |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  | ①②③ | 13～14歳    |                       |  |
| 任意<br>接<br>種   | おたふくかぜ                                              | 1回 保育所など集団生活に入る子は早めに受けるとよいでしょう                                    |                           |              |                                                              |             |             |             |             |             |             | ①            |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |           | (注) 予防効果を確実にするために2回接種 |  |
|                | インフルエンザ                                             | 13歳未満は2回(2～4週間隔)                                                  |                           |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     | ①13歳からは1回 |                       |  |

● 予防接種についての詳しい情報は 国立感染症研究所感染症疫学センター <https://www.niid.go.jp/niid/ja/schedule.html>

● 任意接種のスケジュール例については「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」を参照。 [http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content\\_id=138](http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=138)  
なお日本小児科学会は、受け損ねた場合のスケジュール「キャッチアップスケジュール」も公開しています。

キリトリ線

## ■ 予防接種カレンダー

は望ましい時期の例、①②などの数字はワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。実際に接種する予防接種とスケジュールについては、市区町村の予防接種担当窓口、かかりつけ小児科医に相談しましょう。予防接種は法令等で変更になることがあります。

(令和2年10月1日 情報更新)

| 種類             | ワクチン                                                | 受ける回数                                                             | 標準的な時期                    | 乳児期          |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        | 学童期    |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--|---------------|--|---|--|-----|--|-----------|-----------------------|--|--|
|                |                                                     |                                                                   |                           | 2<br>か<br>月  | 3<br>か<br>月                                                  | 4<br>か<br>月 | 5<br>か<br>月 | 6<br>か<br>月 | 7<br>か<br>月 | 8<br>か<br>月 | 9<br>か<br>月 | 12<br>か<br>月 | 15<br>か<br>月 | 18<br>か<br>月 | 2<br>歳 | 3<br>歳 | 4<br>歳 | 5<br>歳 | 6<br>歳 | 7<br>歳 | 8<br>歳 | 9<br>歳 | 10歳～ |  |               |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
| 定期<br>接<br>種   | インフルエンザ菌b型(Hib)                                     | 計4回／初回は27～56日間隔で3回、<br>その後7～13か月おいて追加1回                           | 初回は生後2～7か月未満              | ①            | ②                                                            | ③           |             |             |             |             |             | ④            |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
|                | 小児用肺炎球菌                                             | 計4回／初回は27日以上の間隔で3回、<br>その後60日以上おいて1歳以降に追加1回                       | 初回は生後2～7か月未満              | ①            | ②                                                            | ③           |             |             |             |             |             | ④            |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
|                | B型肝炎(HBV)                                           | 計3回／27日以上の間隔をあけて2回、<br>その後1回目から139日以上あけて1回接種                      | 生後2～9か月未満                 | ①            | ②                                                            |             |             |             | ③           |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
|                | ロタウイルス                                              | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(1価／2回接種)・5価経口<br>弱毒生ロタウイルスワクチン(5価／3回接種)のいずれかを接種 | 1価<br>5価                  | ① ②<br>① ② ③ | 生後6週から接種可能、1回目は8週～15週未満を推奨<br>1価は生後24週0日まで、5価は生後32週0日までに完了する |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
|                | 四種混合(DPT-IPV)<br>ジフテリア:D<br>百日せき:P<br>破傷風:T ポリオ:IPV | 計4回／1回～3回の間はそれぞれ20～56<br>日(3～8週間)あける<br>3回目の後は1年～1年6か月後に1回接種      | 生後3か月～1歳に<br>最初の3回を       |              | ①                                                            | ②           | ③           |             |             |             |             |              | ④            |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
|                | BCG                                                 | 1回                                                                | 生後5～8か月未満                 |              |                                                              |             | ①           |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
|                | 麻しん・風しん(MR)                                         | 計2回／1回目は1歳以上2歳未満、2回目は<br>5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間                      | 1歳になったらできるだ<br>け早く受けましょう！ |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              | ①            |              |        |        |        | ②      |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
|                | 水痘(水ぼうそう)                                           | 計2回/間隔は3か月以上(標準は6～12か月)あける                                        | 初回は1歳～1歳3か月未満             |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              | ①            | ②            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
|                | 日本脳炎                                                | 1期:6日～28日間隔で2回<br>1期追加:初回終了後、おおむね1年後に1回<br>2期:1回                  | 3歳<br>4歳<br>9歳            |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              | ①<br>② | ③      |        |        |        |        |        |        |      |  | ④<br>2期:9～12歳 |  |   |  |     |  |           |                       |  |  |
|                | 二種混合(DT)                                            | 1回                                                                | 11歳                       |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  | ① |  |     |  |           | 2期:11～12歳             |  |  |
| ヒトパルボウイルス(HPV) | 計3回＊女子のみ                                            | 13歳となる日の属する年度の初日～末日まで                                             |                           |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  | ①②③ |  | 13～14歳    |                       |  |  |
| 任意<br>接<br>種   | おたふくかぜ                                              | 1回 保育所など集団生活に入る子は早めに受けるとよいでしょう                                    |                           |              |                                                              |             |             |             |             |             |             | ①            |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  |           | (注) 予防効果を確実にするために2回接種 |  |  |
|                | インフルエンザ                                             | 13歳未満は2回(2～4週間隔)                                                  |                           |              |                                                              |             |             |             |             |             |             |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |               |  |   |  |     |  | ①13歳からは1回 |                       |  |  |

● 予防接種についての詳しい情報は 国立感染症研究所感染症疫学センター <https://www.niid.go.jp/niid/ja/schedule.html>

● 任意接種のスケジュール例については「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」を参照。 [http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content\\_id=138](http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=138)  
なお日本小児科学会は、受け損ねた場合のスケジュール「キャッチアップスケジュール」も公開しています。

キリトリ線